

Über eine neue cactoide *Euphorbia* der Kanarischen Inseln.

Von

Dr. Oscar Burchard

(Puerto de Orotava).

Mit Tafel I.

Obwohl unsere Kenntnis der Phanerogamen-Vegetation der Kanarischen Inseln dank deren häufiger Untersuchung seitens bedeutender Botaniker am Ende des verflossenen Jahrhunderts bereits eine recht vollständige war, haben neuere Nachforschungen innerhalb der letzten 40 Jahre den schon bekannten Formen eine Reihe neuer Arten und namentlich vieler örtlicher Varietäten hinzugefügt. Kaum jedoch findet sich unter den beschriebenen neuentdeckten Pflanzen eine, welche die Physiognomie der Landschaft wesentlich beeinflusst. Es sind vielmehr meist kleinere und selten Massenvegetation bildende Arten, deren Charaktere erst bei näherer Untersuchung hervortreten.

Seit einer Anzahl von Jahren habe ich mich auf diesen Inseln mit pflanzengeographischen Studien befaßt, deren Ergebnisse ich später im Zusammenhange zu veröffentlichen beabsichtige; vorgreifend möchte ich schon jetzt über eine im Gebiete der Inseln vorkommende, von mir entdeckte große und sogar Massenvegetation bildende zweite cactoide *Euphorbia* berichten, welche sich merkwürdigerweise bisher der Beobachtung entzogen hat.

Es ist mutmaßlich die große Abgelegenheit und dementsprechend schwierige Erreichbarkeit des südlichen Teiles der großen Insel Fuerteventura (wo die neue Art allein vorkommt), welche eine viel seltenere und weniger eingehende Durchforschung der letzteren bedingte, als die zentralen und westlichen Inseln¹⁾ es ermöglichen. Fuerteventura ist eingehender nur um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch DÉPRÉAUX und dann von C. BOLLE botanisch bereist²⁾. Letzterem Forscher verdanken wir eine spezielle Arbeit über die Flora der Purpurarien, die 400 Spezies umfaßt.

1) Einer Seefahrt von zwei Nächten und einem Tage Dauer von Tenerife aus, sowie dreier langer Tagereisen mit Dromedar durch Wüsten ohne jegliche Ortschaften bedarf es, um die Südspitze Fuerteventuras, die sich südwestlich gegen Gran Canaria hin erstreckt, zu erreichen.

2) Die französischen Botaniker J. PITARD, L. PROEST und H. MATTRAIS, welche in den Wintern 1904—05 und 1905—06 die gesamten Inseln des Archipels bereist haben, widmeten der großen Insel Fuerteventura nur wenig Aufmerksamkeit, indem sie Exkursionen auf einige Punkte der nordöstlichen Küste und die Umgebung der Hauptorte beschränkten.

Als ich auf einer meiner Expeditionen nach Fuerteventura am Südbhange des Handiagebirges, nahe der Küstenlinie, reiste, wo steinige Triften große, von den Eingeborenen »tableros« genannte, durch nur un tiefe Rinnen unterbrochene Flächen bilden, auf denen im allgemeinen *Launaea spinosa* Sch. Bip. die häufigste und auffallendste Strauchform darstellt, war ich nicht wenig erstaunt, vor der Mündung des »valle de los mosquitos« durch eine dicht mit einer langstacheligen Sukkulente bestandene Steppe zu kommen. Ich ließ sofort halten und schnitt eine der Pflanzen mit meinem Messer an, ob ihr Milch entfließe, denn primo visu glaubte ich einen *Cereus* oder eine verwandte Kaktee vor mir zu haben. Um eine Varietät von *Euphorbia canariensis* L. konnte es sich auf keinen Fall handeln, auch bevor es mir gelang, die kleinen grünen Blüten, welche an einzelnen der Exemplare bereits erschienen, aufzufinden, und obwohl mein eingeborener Begleiter aus dem Handiagebirge die Pflanze, wie letztere, mit dem Namen »cardón« bezeichnete. Die nähere Untersuchung ergab ein echtes *Diacanthium*, welches ich mit keiner der in Marokko und Nordwestafrika vorkommenden Spezies identifizieren konnte und gebe ich nachstehend dessen Diagnose. Die mir leider infolge der frühen Jahreszeit nicht zugänglich gewordenen Kapseln öffnen sich — nach Aussage der Eingeborenen — wie die von *E. canariensis* im Sonnenschein mit lautem Knalle.

***Euphorbia* (sect. *Diacanthium*) *handiensis* Burchard n. sp.**

Planta perennis habitu Cactum referens 0,80—1 m et ultra altitudine, caule primario indurato-frutescente, cortice coriaceo laete viridi, ex basi, jam juvenis, ramosissima, ramis 6—8 cm diametro carnosus, 3—12-polygonis, valleculis acutangulis, costis lineariter scutellis prominentibus albis cordiformibus cum spinis binis acutis patentibus longitudine 2—3 cm ornatis, scutellis spinisque aetate juvenili in innovationibus terminalibus colore rubro procedentibus, demum fuscis, denique albidis, floribus monoecis viridibus minutissimis, 2,5—3 mm longis, 1,5—2 mm crassis, anguste-calyciformibus 5-lobis, in petiolum subnullum contractis, plerumque singulis, raro binis, bracteis binis oppositis semiorbicularibus, nigrescentibus, margine paulum membranaceis, suffultis, gemmae brevissimae 1—2 mm altae inter scutella innovationum terminalium irregulariter posita insidentibus, pistillo hyalino involucri longitudine fere aequali superne conoideo-acuminato, apice bipartito; capsula ignota.

Hab.: In terris arenosis alluvionum partis inferioris convallis »Gran valle« nec non ad exitum convallis »de los mosquitos« denominatorum montium Handiae meridionalium adgregationes extensas formans, in insula canariensi Fuerteventura, vix 100 m s. m.

Ökologisch wichtig ist der Unterschied gegenüber *E. canariensis*, daß die neue Art die Bewohnerin großer Flächen in den breiten, durch vulka-

nische Sande und Gesteinbrocken überlagerten Ebenen in und vor den südlichen Handiatälern (an nur zwei, allerdings ziemlich ausgedehnten Stellen) ist, während die erstere steile Felshänge bewohnt, oder auf festen, oft rezenten Laven Fuß faßt und im Gebirge bis ca. 1000 m Höhe (Adeje-Berge, Tenerife) emporsteigt¹⁾. Nicht einmal auf die sanftgeneigten Talflanken der »tableros« geht *E. handiensis* über. Sie findet hier zweifellos besondere, in der Entstehungsgeschichte des Handiagebirges begründete Bedingungen und wir vermissen sie auf der in nur 75—80 km Entfernung westlich gegenüberliegenden, in einer niedrigen Steilküste zum Meere fallenden Ostseite der Insel Gran Canaria. Auch an der steilen Nordwand der Handiagebirge (welche hier nur einen schmalen Streifen weißen Muschel-sandes freilassen) fehlt sie, während hier *E. canariensis* in kräftigen, über mannshohen Exemplaren an den Felsen vorkommt.

Letztere Art findet sich nach meinen eingehenden und wiederholten Untersuchungen auf der Südseite des Handiagebirges nicht vor. Die Angabe BOLLES in seinen »Botanischen Rückblicken« von *E. canariensis* für dieses Gebiet scheint daher darauf hinzudeuten, daß er an den Beständen der von mir beschriebenen Art wohl vorübergekommen sein mag, jedoch vielleicht in zu großer Entfernung oder bei Dämmerung. Denn, ohne die Bestachelung zu erkennen, würde wohl jeder die Art für *E. canariensis* halten, zumal da die Eingeborenen sie mit dem gleichen Namen benennen


Benutzte Literatur.

- BOLLE, C., Florula insularum Purpurariarum nunc Lanzarote et Fuerteventura etc. In ENGLERS Bot. Jahrb. XIV. 1894.
 — Botanische Rückblicke auf die Inseln Lanzarote und Fuerteventura. In ENGLERS Bot. Jahrb. XV. 1892.
 SAUER, FR., Catalogus plantarum in canariensibus insulis sponte et subsponte crescentium. Dissert. inaug. Halis Saxonum 1880.
 CHRIST, H., Spicilegium canariense. In ENGLERS Bot. Jahrb. IX. 1887.
 SCHENCK, H., Beiträge zur Vegetation der Kanarischen Inseln. In Deutsche Tiefseeexpedition 1898—1899, Bd. II. I. Teil, 1907.
 PITARD, J., et L. PROUST, Les Iles Canaries. Flore de l'Archipel. Paris. Klincksieck 1908.
 BALL, J., Spicilegium Florae Maroccae. In The Journal of the Linnean Society Vol. XVI.
 COSSON, De Euphorbiis cactoides Maroccanis. In Bull. Soc. Bot. Fr. XXI. p. 162 et seq.

Erklärung der Abbildungen.

Euphorbia handiensis Burchard am Ausgange des Valle de los Mosquitos im südlichen Handia-Gebirge auf Fuerteventura.

¹⁾ Nicht 300 m, wie PITARD irrtümlich angibt.



Burchard.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.